

neo-angin® Halstabletten

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was sind neo-angin® Halstabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von neo-angin® Halstabletten beachten?
3. Wie sind neo-angin® Halstabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind neo-angin® Halstabletten aufzubewahren?

Gebrauchsinformation

neo-angin® Halstabletten

Zusammensetzung:

1 Lutschtablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile: 2,4-Dichlorbenzylalkohol 1,2 mg Amylmetacresol 0,6 mg Levomenthol 5,9 mg
Sonstige Bestandteile: Sternanisöl, Pfefferminzöl, Ponceau 4R Zubereitung 80 %, Sucrose (Saccharose), Glukose-Sirup (Trockensubstanz), Weinsäure (Ph.Eur.).

neo-angin® Halstabletten sind in Packungen mit 24 Lutschtabletten erhältlich.

1. Was sind neo-angin® Halstabletten und wofür werden Sie angewendet?

1.1 neo-angin® Halstabletten sind ein Mund- und Rachen therapeutikum.

1.2 von: Divapharma-Knufinke Arzneimittelwerk GmbH
Motzener Straße 41
12277 Berlin
Tel. 030/72007-266
Fax 030/72007-352

1.3 neo-angin® Halstabletten werden angewendet:

Zur Vorbeugung und Behandlung von entzündlichen und infektiösen Erkrankungen des Mund-, Hals- und Rachenraumes, wie Halsschmerzen, Erkältung, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Mandelentzündung (Tonsillitis, Angina), Entzündungen der Mundschleimhaut (Stomatitis, Soor, Aphthen), des Zahnfleisches (Gingivitis), Rachenkatarrh (Pharyngitis), Kehlkopfkatharrh (Laryngitis), zur Vorbeugung bei Gefahr grippaler Infekte.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von neo-angin® Halstabletten beachten?

2.1 neo-angin® Halstabletten dürfen nicht angewendet werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2,4-Dichlorbenzylalkohol, 3-Methyl-4-pentylphenol, Levomenthol, Ponceau 4R oder einem der sonstigen Bestandteile von neo-angin® Halstabletten sind.
- wenn Sie an der seltenen erbten Fructose-Unverträglichkeit, der seltenen Glucose-Galactose-Malabsorption oder einem Saccharase- Isomaltase-Mangel leiden.
- von Kleinkindern.

Es liegen keine Daten über die Verträglichkeit von neo-angin® Halstabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. neo-angin® Halstabletten dürfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von neo-angin® Halstabletten ist erforderlich

Wichtige Wahrnhinweise über bestimmte Bestandteile von neo-angin® Halstabletten
Ponceau 4R kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 Lutschtablette enthält 1,14 g Glucose und 1,42 g Saccharose (Zucker) entsprechend ca. 0,22 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.
Der häufige und dauernde Gebrauch von neo-angin® Halstabletten kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

2.3 Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen sind nicht bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie sind neo-angin® Halstabletten einzunehmen?

Nehmen Sie neo-angin® Halstabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum

3.2 Falls vom Arzt nichts anderes verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren lassen alle 2-3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen (maximal 6 Tabletten pro 24 Stunden). Wenden Sie neo-angin® Halstabletten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche an.

3.3 Wenn Sie die Einnahme von neo-angin® Halstabletten vergessen haben:

Sollten Sie eine Anwendung vergessen haben, bitte nehmen Sie dann nicht die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Anwendung in der angegebenen Weise fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann neo-angin® Halstabletten Nebenwirkung haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten

Häufig: mehr als 1 von 100 Behandelten

Gelegentlich: mehr als 1 von 1.000 Behandelten

Selten: mehr als 1 von 10.000 Behandelten

Sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

Sehr selten können Magenbeschwerden auftreten. Sehr selten kann es zu Schleimhautreizungen kommen.

Ponceau 4R kann Überempfindlichkeiten auslösen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie sind neo-angin® Halstabletten aufzubewahren?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der äußeren Umhüllung und der Durchdrückpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information:

Dezember 2004

Pflichttext:

neo-angin® Halstabletten, Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von entzündlichen und infektiösen Erkrankungen des Mund-, Hals- und Rachenraumes, wie Halsschmerzen, Erkältung, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, Mandelentzündung (Tonsillitis, Angina), Entzündungen der Mundschleimhaut (Stomatitis, Soor, Aphthen), des Zahnfleisches (Gingivitis), Rachenkatarrh (Pharyngitis), Kehlkopfkatarrh (Laryngitis), zur Vorbeugung bei Gefahr grippaler Infekte. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.

Klosterfrau • Klosterfrau Homöopathie • Klosterfrau Mobilind • Klosterfrau Broncholind® • Klosterfrau Nervenruh • Klosterfrau Gastrolind® • Gastrobin® • taxofit® • Tiger Balm® • neo-angin® • Maaloxan® / Maalox® • Soledum® • nasic® • nasic®-cur • Bronchicum® • anginetten® • Ricola® • Krügerol® • Vita-Gerin®-Geistlich N • regazell energen plus • Contramutan® • Limptar® • Cholagogum Nattermann® • Ameu • Bedan • Hepar SL • Jarsin • Kwai • Kwai Vitabetics • Kaveri • Faros • Sedonium • Euminz • Enelbin® • Carnigen® • Essaven® • Lipostabil® • Melrosum® • Monapax® • Traumanase® • Maria Galland • yul® • Goldsam • condomi® • Assugrin • Thüringer • Migränin • Mono Migränin • Balneum Aqeo • Balneum Hermal • Balneum Intensiv • Balneum Junior • Balneum Lutsine • Dobendan • Nurofen • Clearasil •

© 2006 Klosterfrau Vertriebs GmbH