

## Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

# CROTAMITEX® GEL

Wirkstoff: Crotamiton



Gel zur Anwendung auf der Haut

### Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 g Gel enthält 50 mg (5%) Crotamiton

Sonstige Bestandteile: Ammoniak-Lösung 25%, Gereinigtes Wasser, Propan-2-ol, Carbomer 980, Parfümöl Lonicera PH 799916 Haarmann & Reimer

### Darreichungsform und Packungsgrößen

Originalpackung mit 40 g Gel (N1)

Originalpackung mit 100 g Gel (N2)

Bündelpackung mit 200 g (2 x 100 g) Gel (N3)

### Antiscabiosum

#### Pharmazeutischer Unternehmer

gepepharm GmbH, Josef-Dietzgen-Str. 3, 53773 Hennef, Tel.: 02242-8740-200, Fax: 02242-8740-299

#### Hersteller

biomo pharma GmbH  
Josef-Dietzgen-Str. 3, 53773 Hennef

### Anwendungsgebiete

Skabies

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Crotamitex Gel nicht anwenden?*

Sie dürfen Crotamitex Gel nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Crotamiton oder Bestandteile der Gesamtformulierung. Außerdem dürfen Sie Crotamitex Gel nicht anwenden bei akutem nässenden Hautausschlag (Akute exsudative Dermatitis).

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft oder der Stillperiode beachten?*

Crotamitex Gel sollte nur nach sorgfältiger Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses und unter Berücksichtigung von Alternativpräparaten während der Schwangerschaft und/oder der Stillperiode angewendet werden. Befragen Sie bitte hierzu unbedingt vorher Ihren Arzt.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Crotamitex Gel ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

*Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?*

Achten Sie darauf, daß Crotamitex Gel nicht mit der Augenbindehaut in Berührung kommt. Schleimhäute (Mund, Nase) sind beim Auftragen von Crotamitex Gel

auszusparen.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

### Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Crotamitex Gel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Crotamitex Gel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wie und wie oft sollten Sie Crotamitex Gel anwenden?*

Crotamitex Gel sollte 1 mal täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen werden.

Die Anwendung sollten Sie an 3 bis 5 aufeinanderfolgenden Tagen wiederholen, bis Sie beschwerdefrei sind.

### Anwendungsfehler und Überdosierung

*Was ist zu tun, wenn Crotamitex Gel in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?*

Überdosierungen sind nicht bekannt. Überschüssiges Gel können Sie problemlos mit Wasser entfernen.

### Nebenwirkungen

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Crotamitex Gel auftreten?*

In Einzelfällen kann es Überempfindlichkeitsreaktionen geben und es kann eine vorübergehende Rötung, verbunden mit Wärmegefühl, auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Bei ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sollten Sie Crotamitex Gel nicht mehr anwenden. Befragen Sie Ihren Arzt, damit er gegebenenfalls über erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit von Crotamitex Gel

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Behältnis und auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

### Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: November 2004

## Patienteninformation

Crotamitex-Präparate haben sich seit vielen Jahren bei der Behandlung von Skabies (Milben) international bewährt.

Durch die sichere milbenabtötende Wirkung von Crotamitex werden auch die Begleitsymptome der Skabies wie quälende Hautreizungen, die von den Patienten als sehr unangenehm empfunden werden, beseitigt.

Die Hautirritationen verleiten die Patienten zum Kratzen. Crotamitex kann möglicherweise hervorgerufenen Hautreizungen und der damit verbundenen Gefahr einer zusätzlichen Hautinfektion wirkungsvoll begegnen.

Dies trifft ganz besonders auf Kinder zu, die ihre Haut oft bis zum Bluten aufkratzen.

Crotamiton, der Wirkstoff von Crotamitex, zeichnet sich durch seine sehr gute Verträglichkeit gegenüber anderen Parasiten-Mitteln aus und darf nach vorsichtiger Abwägung auch bei Kleinkindern und Säuglingen eingesetzt werden.

Crotamitex Salbe empfiehlt sich besonders bei Patienten mit trockener Haut. Sie läßt sich leicht einreiben, schmiert nicht und hinterläßt auch keinen unangenehmen Fettglanz.

Crotamitex Lotio eignet sich zur großflächigen Anwendung und auf behaarten Hautpartien. Sie läßt sich bequem auftragen, zieht schnell ein und ist sehr textilfreundlich.

Crotamitex Gel enthält Crotamiton in einer im Vergleich zur Salbe und Lotio niedrigeren Konzentration.

Das Gel eignet sich besonders für die Behandlung stark behaarter Hautpartien.

Es zieht sehr schnell in die Haut ein, fettet nicht und wird angenehm kühl empfunden.

### **Behandlungsanweisung bei Milbenbefall (Skabies):**

1. Vor der ersten Behandlung sollten Sie warm baden oder duschen!
2. Reiben Sie Ihren ganzen Körper einmal täglich (ohne Gesicht und behaarten Kopf) mit Crotamitex ein.  
Vergessen Sie nicht den Geschlechtsbereich und die Fußsohlen! Wiederholen Sie die Behandlung an 3-5 aufeinanderfolgenden Tagen.
3. Sind einzelne Körperpartien nach dem Einreiben mit Wasser in Kontakt gekommen (z.B. durch Händewaschen), muß Crotamitex erneut aufgetragen werden!
4. Nach jedem Einreiben ziehen Sie bitte frische Kleidungsstücke an!
5. Wechseln Sie täglich die Bettwäsche!
6. Verwenden Sie wegen der Ansteckungsgefahr keine Wäsche, Handtücher, Waschlappen, Kissen, Decken, Kämmen usw., die auch von anderen Personen benutzt werden!
7. Vermeiden Sie während der Erkrankung längeren Körperkontakt mit anderen Personen, um einer Übertragung der Milben vorzubeugen.

Sorgen Sie dafür, daß Ihre ganze Familie mit Crotamitex behandelt wird, damit Sie die Milben und die damit einhergehenden Hautreizungen möglichst schnell wieder los werden.