

## GEBRAUCHSINFORMATION

**BIOCHEMIE PFLÜGER®**

**Nr. 16 Lithium chloratum D 6**

Homöopathisches Arzneimittel

### Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Wirkstoff:

Lithium chloratum Trit. D 6 (HAB, V. 6) 250,0 mg.

Sonstige Bestandteile: Calciumbehenat (DAB),  
Kartoffelstärke.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose.

Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit  
Ihrem Arzt oder Therapeuten ein, wenn Ihnen bekannt  
ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber  
bestimmten Zuckern leiden.



Lithium  
chloratum  
D 6

16

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne  
Angabe einer therapeutischen Indikation.  
Bei Fortdauern der Krankheitssymptome während der An-  
wendung soll medizinischer Rat eingeholt werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Nach Anbruch bitte kühl und trocken lagern.  
Das Behältnis fest verschlossen halten.

Das Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht  
mehr anwenden!

Reg.-Nr. 57895.00.00

Inhalt: **400** Stück  
Tabletten zum Einnehmen.

05.20



Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller:  
Homöopathisches Laboratorium  
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG  
Röntgenstraße 4  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück



**PFLÜGER**  
SCHÜBLER-SALZE



PZN -06322294

Ch.-B.:

Verwendbar bis:



**Gegenanzeigen:** keine bekannt.

**Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit berücksichtigen?*

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt um Rat.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker angewendet werden.

**Wechselwirkungen:** keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

**Dosierung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit das Arzneimittel nicht anders verordnet wurde:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 1 Tablette ein. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Lassen Sie die Tablette langsam im Mund zergehen.

Die Dosierung bei Kindern erfolgt nach Anleitung eines homöopathisch erfahrenen Arztes oder Heilpraktikers.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Weitere erhältlichliche Packungsgröße:

100 Tabletten.

Zusätzliche Darreichungsform:

30 ml Tropfen.

Stand der Information: Februar 2019